

INSTRUCTIONS POUR LE BLANCHIMENT DES DENTS

À la clinique dentaire Ideal, nous utilisons le système de blanchiment des dents Opalescence. La seringue contient une solution à 15 %. Elle doit être utilisée une fois par jour (idéalement le soir) pendant 4 à 6 heures. Si vous êtes sensible, commencez à vous brosser les dents avec un dentifrice pour les dents sensibles 2 semaines avant de commencer votre traitement de blanchiment. Vous avez le contrôle sur le processus de blanchiment. Une fois que vous avez atteint le résultat souhaité, vous devez arrêter le traitement. Voici les instructions pour le kit de blanchiment des dents Opalescence à domicile.




Placement de l'appareil

- Brossez-vous les dents avec du dentifrice pour les dents sensibles.
- Placez une petite goutte de gel blanchissant dans chaque compartiment du plateau pour les dents en cours de traitement.
- Placez le plateau avec le gel autour des dents.
- Essuyez l'excès de gel dans la bouche avec un mouchoir ou une brosse douce et sèche.
- Après le traitement, retirez le plateau de blanchiment. Rincez le plateau de blanchiment à l'eau froide et rincez-vous la bouche à l'eau tiède.
- Brossez-vous les dents.

Si vous ressentez une sensibilité

- Les patients qui ressentent une sensibilité peuvent avoir besoin de modifier leur programme de traitement, par exemple en prenant une pause d'un ou deux jours entre les séances. Il est également recommandé de réduire le nombre de traitements lorsque la sensibilité est un problème.



INSTRUCTIONS POUR LE BLANCHIMENT DES DENTS

Précautions :

- Si vous avez des questions concernant l'utilisation appropriée de ce produit, y compris la durée nécessaire pour blanchir vos dents, veuillez contacter la clinique.
- Des contrôles dentaires réguliers et des nettoyages sont importants avant et après le blanchiment pour maintenir un sourire sain.
- Certains patients ont signalé une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge ou de la langue. Si l'un de ces symptômes persiste plus de deux jours ou s'aggrave progressivement, contactez votre dentiste. Ces effets secondaires disparaissent généralement dans un délai de 1 à 3 jours après l'arrêt du traitement.
- Les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que les patients ayant des problèmes de santé graves, ne doivent pas effectuer de blanchiment. Consultez leur fournisseur de soins de santé principal avant le traitement.
- Si le patient est allergique ou hypersensible à l'un des ingrédients de l'agent de blanchiment Opalescence, ne pas utiliser.
- N'utilisez pas d'eau de Javel domestique pour blanchir les dents.
- N'utilisez pas de tabac et ne mangez pas lorsque les plateaux de blanchiment sont en place. Les dents sont naturellement plus foncées le long de la ligne des gencives. Ces zones peuvent nécessiter plus de temps pour s'éclaircir que le reste de la surface des dents et rester légèrement plus foncées.
- Les taches blanches qui apparaissent sur l'émail pendant le processus de blanchiment peuvent se fondre avec une poursuite du blanchiment.
- Les couronnes, les bridges, les prothèses partielles, les facettes et les obturations composites ne se blanchissent pas.
- Le café, le tabac et d'autres produits peuvent provoquer une nouvelle coloration des dents au fil du temps. Dans ce cas, les dents peuvent être à nouveau blanchies.
- Certaines obturations en amalgame peuvent laisser une couleur violette foncée dans le plateau de blanchiment ; ceci est normal.
- Vérifiez la date de péremption et conservez selon les instructions.
- Évitez d'avaler de grandes quantités de gel ou d'eau utilisée pour rincer le résidu de gel des dents.
- Évitez tout contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact : Rincez abondamment à l'eau et demandez conseil à un professionnel de santé si les symptômes persistent.

